

FLORASUSTAR-E es un herbicida de post-emergencia de gran versatilidad para el control de malas hierbas de hoja ancha en trigo y cebada. Con una amplia ventana de aplicación puede ser aplicado desde invierno, con 2 hojas del cereal, hasta final de ajado. Su eficacia está demostrada en hierbas problemáticas como *Papaver rhoeas* (amapola), *Matricaria* sp. (margarita), *Galium aparine* (lapa), *Sinapis arvensis* (amarillas) y *Scandix pecten-veneris* (peine de Venus) entre otras. FLORASUSTAR-E tiene una excelente selectividad y no tiene problemas de rotación para el cultivo siguiente. Además, es compatible con todos los graminicidas de pre y post-emergencia del mercado a los que complementa en el control de malas hierbas.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO

Cultivo	Efecto	Momento de aplicación	Dosis	Núm. máx. de aplicaciones	PS* (días)
Cebada y Trigo	Dicotiledóneas	Post-Emergencia, dos hojas hasta final de ajado	75-150 cc/ha	1	NP

Aplicar en pulverización normal, en post-emergencia temprana del cultivo, desde 2 hojas hasta el final del ajado, con las malas hierbas en post-emergencia temprana, entre 4 y 6 hojas en aplicación única. Malas hierbas sensibles: *Galium aparine*, *Sinapis arvensis*, *Matricaria* sp., *Papaver rhoeas*, *Anthemis arvensis*, *Cpaseella bursa-pastoris*, *Diploaxis erucoides*, *Raphanus raphanistrum* y *Stellaria media*. No aplicar sobre cultivos dañados o estresados (condiciones meteorológicas adversas, o con síntomas de ataques de plagas o enfermedades). Sin embargo, se recomienda llevar a cabo las aplicaciones cuando la temperatura del aire esté por encima de 5 °C y por debajo de 25 °C (en la sombra). Se necesita una hora sin lluvia después de la aplicación. El mejor momento para aplicar FLORASUSTAR-E es cuando la vegetación se recupera al final del invierno. Para una eficiencia óptima, el tratamiento debe hacerse en malezas jóvenes. Evite cualquier deriva hacia cultivos adyacentes sensibles, para esto es imperativo tratar en clima tranquilo, sin viento (<5 m/segundo). Recomendaciones para trigo. En cebada, no mezcle FLORASUSTAR-E con triazoles. Es compatible con graminicidas de pre y cebada más comunes excepto Talkoxidin en donde puede haber una disminución de eficacia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Antes de comenzar a llenar el tanque de aplicación, asegúrese de que esté limpio y libre de cualquier tratamiento previo. Agitar el envase antes de usar. Vierta la cantidad requerida de FLORASUSTAR-E en el tanque de aplicación medio lleno de agua. Completar con el volumen de agua necesario para la aplicación, manteniendo la agitación. Prepare solo la cantidad de mezcla necesaria para la aplicación. Volumen de aplicación. Use FLORASUSTAR-E en un volumen de suspensión de 200 a 400 L/ha.

RECOMENDACIONES Mantenga el producto solo en su embalaje original, en un lugar específico para fitosanitarios que cumpla con la normativa vigente, lejos de alimentos y bebidas, incluidos aquellos para animales. Mantener fuera del alcance de niños y personas no autorizadas. Almacenar la preparación a una temperatura superior a -5 °C.

ADVERTENCIA Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIAS FLORASUSTAR-E es un herbicida de la familia de las triazopirimidinas sulfonamidas y actúa inhibiendo la acción enzimática de la acetolactato sintetasa (ALS) (Grupo B, HRAC). Para este grupo se ha descrito desarrollo de resistencias, por lo que deben tomarse las siguientes precauciones que minimicen dicho riesgo: - No aplicar FLORASUSTAR-E más de una vez por campaña. - Alternar herbicidas de diferentes modos de acción para evitar el desarrollo de resistencias. - Seguir las instrucciones de la etiqueta relativas a las dosis y tiempos de aplicación.



Nombre comercial: Florasustar-E
País de origen del producto: Francia
Nombre: Florasustar (N° AMM) 2150130
Nombre del importador: LIFE SCIENTIFIC SPAIN S.L.U.
Ronda Narciso Monturiol, 6
Edificio Destro B, Local 2-B
46980 Paterna (Valencia) España
960 088 372 - Fabricación en la UE
Producto de referencia España NIKOS
Inscrito en el R.O.P.M.F. del Magrama con el n° 22145



Registrado y titular del A.M.M.
Life Scientific Limited
Block 4, Belfield Office Park
Beech Hill Road, Dublin 4 IRLANDA
Marca registrada por LIFE SCIENTIFIC SPAIN S.L.U

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P261:** Evitar respirar la niebla. **P501:** Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. **P273:** Evitar su liberación al medio ambiente. **P280:** Llevar guantes, prendas y máscara de protección. **P391:** Recoger el vertido. **EUH 210:** Puede solicitar la ficha de datos de seguridad. **EUH 208:** Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica. **Este preparado no se usará en combinación con otros productos.**

Contenido:

1L

Fecha y lote de fabricación:
Ver envase

Tipo de acción:
Herbicida de post-emergencia (HRAC B)

Formula:
Suspensión concentrada (SC)

Atención



Versión N° 1

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirarse las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Llame a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respire artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Recomendaciones en caso de: Inhalación: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, entonces aplique la respiración artificial; use un protector (máscara de bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un doctor para consejos de tratamiento. **Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento. **Contacto con los ojos:** Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento. **Ingestión:** No requiere tratamiento médico de emergencia.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. Cuando se llame al médico o al centro de control de envenenamiento, o se traslade para tratamiento, tenga disponible a mano, si es posible, la etiqueta del producto.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Tel. 91 562 04 20 (En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta)

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. El usuario final es responsable de entregarlos en algunos de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: Seguridad del aplicador: Lávese las manos después de manipular / usar / intervenir en una área previamente tratada. Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento. No coma, beba, llame por teléfono o fume mientras usa el producto. En trigo y cebada mediante pulverización normal con tractor durante la mezcla/carga. Limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo como mínima medida de protección individual, y durante la aplicación ropa de trabajo. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, excepto de la ropa de trabajo siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación. Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. **Seguridad del trabajador:** Para todos los usos autorizados se deberá utilizar ropa de trabajo.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

